



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع) - رشت

برگه آموزش به مددجویان داکریوسیستورینوستومی (عمل جراحی مجرای اشکی) در زمان ترخیص ویژه چشم"

- ۱- جهت جلوگیری از خونریزی و کبودی از کیسه یخ روی بینی (ناحیه عمل) استفاده می شود
- ۲- از فین کردن و زور زدن خودداری نمایید
- ۳- تا ۳ روز از استحمام خودداری نمایید و پس از آن از آب ولرم جهت استحمام استفاده شود.
- ۴- دستورات دارویی بعد از عمل به شرح زیر می باشد:

- ✓ قطره کلرآمفنیکل هر ۸ ساعت داخل چشم سمت عمل شده چکانده شود
- ✓ قطره بتامتازون هر ۸ ساعت داخل چشم سمت عمل شده چکانده شود
- ✓ قطره فنل افرین چشمی هر ۶ ساعت داخل بینی سمت عمل شده تا ۳ روز چکانده و سپس قطع شود
- ✓ اسپری بکلومتازون هر ۱۲ ساعت داخل بینی سمت عمل شده اسپری شود
- ✓ کیسول سفالکسین هر ۶ ساعت میل شود
- ✓ پماد بتامتازون و تتراسایکلین هر ۱۲ ساعت روی ناحیه بخیه مالیده شود

علامت هشدار دهنده جهت مراجعه بعدی: خروج ترشحات چرکی، خونریزی، تورم چشم، قرمزی مداوم چشم، درد و تب