



برگه آموزش به بیمار بعد از عمل جراحی ویتراکتومی در زمان ترخیص

- ۱- بعد از عمل جهت محافظت از محل و جلوگیری از ضربه به چشم ، از محافظ پلاستیکی (شیلد) به مدت ۲ تا ۳ هفته استفاده کنید . روزها می توانید از عینک و شبها از شیلد (محافظ چشم) استفاده نمائید . محافظ پلاستیکی قابل شستشو است روزانه انرا شسته و سپس روی چشم خود بگذارید .
- ۲- پس از عمل جراحی شبکیه ، نحوه استراحت و قرار دادن سر بسیار مهم است که با توجه به محل پارگی و نوع عمل جراحی متفاوت می باشد و توسط جراح به شما توضیح داده میشود و لازم است بدقت رعایت شود زیرا که در میزان موفقیت عمل تاثیر بسزائی دارد .
- ۳- پس از عمل ، گاهی از قرصهای کورتن بر حسب تشخیص جراح استفاده می شود که اغلب پس از یک هفته تا ده روز بعد از عمل قطع میشود . استفاده از کورتن جهت کاهش التهاب و سیر بهبودی بیماری است حتما به توصیه های پزشک در زمینه مصرف دقت کنید .
- ۴- پس از عمل ، مسافرت با اتومبیل و قطار بلامانع است . قبل از مسافرت با هواپیما با پزشک مشورت شود
- ۵- بخیه های چشم دو نوع می باشند : بخیه های عمقی ، که دائمی بوده و برداشته نمی شوند و بخیه های سطحی ، که اگر پس از ۲ یا ۳ هفته نیافتاده باشد توسط جراح برداشته میشوند .
- ۶- بعد از عمل احتمال جدا شدن مجدد شبکیه و خونریزی داخل چشم وجود دارد . در صورت کاهش دید ، کشیده شدن پرده یا تار شدن یک منطقه از میدان دید یا جرقه در چشم بلافاصله به جراح خود مراجعه کنید و در صورت در دسترس نبودن پزشک معالج به اورژانس چشم پزشکی بیمارستان مراجعه نمائید
- ۷- بهترین دید حدود ۳-۴ ماه بعد از عمل جراحی حاصل خواهد شد منوط به اینکه شبکیه چسبیده باشد و عیب انکساری ایجاد شده نیز اصلاح شده باشد . اما علیرغم همه تلاشها و مراقبتها درصدی از اعمال جراحی شبکیه با موفقیت همراه نبوده و نیاز به تکرار و یا اعمال جراحی کاملتر و اضافه تر خواهد بود و حتی در مواردی ممکن است علیرغم اعمال مکرر بهبودی دید بیمار حاصل نگردد
- ۸- در تاریخ های تعیین شده جهت معاینه و پیگیری حتما مراجعه فرمائید .
- ۹- تعداد روزهای بعد از عمل را همیشه بخاطر بسپارید و در هر مراجعه یادآوری نمائید . (بهتر است خلاصه پرونده را به همراه داشته باشید)
- ۱۰- از قطع یا مصرف خودسرانه داروها خودداری نمائید .
- ۱۱- در هر مراجعه داروهای مصرفی بخصوص قطره ها را با خود بیاورید و نام آنها را بخاطر بسپارید زیرا ممکن است به علت مشابهت ظاهری برخی قطره ها و نداشتن دید کافی داروها را جابجا مصرف نمائید .
- ۱۲- دقت کنید برچسب روی قطره ها کنده نشود و هر قطره را پس از مصرف در جلد خود قرار دهید .
- ۱۳- نحوه مصرف قطره ها را از پزشک خود سئوال کنید (مصرف صحیح و به موقع داروها پس از عمل در میزان موفقیت عمل تاثیر بسزایی دارد) .
- ۱۴- سعی کنید قطره ها را در زمان تعیین شده توسط پزشک استفاده نمائید . در فواصل خواب (۵-۶ ساعت) لازم نیست برای چکاندن قطره از خواب بیدار شوید ولی بهتر است این مسئله را از پزشک خود سئوال کنید .

- ۱۵- سعی نمایید قطره باز شده را در حرارت عادی (۳۰-۲۵ درجه سانگراد) نگه داری نموده و حداکثر تا ۳ هفته پس از باز نمودن درپوش از آن استفاده کنید. بنابراین از یخ زدگی یا گرمای شدید جلوگیری شود و قطره ها یخچال در قسمت پائین قرار دهید
- ۱۶- از تماس نوک قطره با چشم یا سطوح دیگر جلوگیری کنید. پس از هر بار مصرف در پوش ظرف را محکم ببندید چنانچه دست شما به نوک قطره چکان برخورد کرد باید قطره دور انداخته شود و قطره جدید تهیه شود
- ۱۷- در صورتیکه قطره تغییر رنگ یا رسوب داد از آن استفاده نکنید.
- ۱۸- هیچگاه اطراف چشم را با پارچه های خشن یا دستمال کاغذی تمیز نکنید زیرا اینکار ممکن است باعث خراش قرنیه شود.
- ۱۹- صبح ها پس از بیدار شدن از خواب ممکن است اطراف مژه ها و گوشه چشم ترشحات زیادی جمع شود که برای تمیز کردن آنها می توانید از قطره های چشمی انتی بیوتیک (کلرامفنیکل ، جنتامایسین ، سولفاستامید و ..) داخل چشم و روی پلک ها ریخته و سپس به اهستگی با پنبه یا تنظیف استریل آنرا تمیز کنید. مراقب باشید که فشار انگشت مستقیما به کره چشم وارد نشود زیرا این امر میتواند سبب باز شدن بخیه ها یا زخم محل عمل شود.
- ۲۰- نماز خواندن از روز عمل با تیمم فقط بر روی سنگ بلامانع است ولی تا یک هفته از سجده کردن خودداری کنید و مهر را با دست به پیشانی نزدیک کنید (قبل از دستور پزشک از سجده کردن خودداری نمائید)
- ۲۱- زمان حمام کردن را حتما از پزشک خود سؤال کنید. اما میتوانید از همان روز اول پس از عمل تمام بدن بجز سر و صورت را بشویید. موقع شستشوی سر و صورت باید چشم ها را بسته نگه داشته و به هیچ وجه به پلک ها فشار نیاورید. بهتر است از شامپو و صابون بچه استفاده کنید.
- ۲۲- مطالعه ، تماشای تلویزیون و فعالیتهای عادی زندگی که توام با فعالیت شدید جسمانی نباشد و نحوه صحیح قرار گرفتن سر ، رعایت شود بلامانع است.
- ۲۳- این بیماری و عمل جراحی ان از نظر تغذیه ، رژیم خاصی ندارد و چنانچه قبل از عمل رژیم معینی داشتید (دیابت - فشارخون - زخم معده و ...) بعد از عمل هم به همان رژیم ادامه دهید.
- ۲۴- از بکار بردن مواد آرایشی (سرمه ، ریمل ، مژه مصنوعی ، لنزهای رنگی ، مواد روغنی در اطراف چشم و ...) جدا خودداری نمائید و زمان شروع آنرا از پزشک معالج سؤال کنید.
- ۲۵- ورزش های سبک و بدون ضربه به چشم اشکالی ندارد اما از شنا ، بوکس و نظائر ان که به چشم ضربه میزنند جدا خودداری نمائید.

علایم هشدار دهنده همت مراجعه بعدی: کاهش دید، کشیده شدن پرده یا تار شدن یک منطقه از میدان دید یا جرقه